



VERLETZTER ZAHN: WAS SOLL ICH TUN?

Woran erkenne ich, ob ich behandelt werden muss?

Bei jeder Verletzung am Mund sollten Sie unverzüglich Kontakt zu Ihrem Zahnarzt aufnehmen, um abzuklären, ob eine Behandlung erforderlich ist. Der Zahnarzt wird den betroffenen Bereich untersuchen und möglicherweise Röntgenaufnahmen machen.

Haben Sie einen abgebrochen oder ausgeschlagenen Zahn, bewahren Sie den Zahn oder abgebrochenen Teil des Zahns auf und nehmen Sie diesen mit zum Zahnarzt.

Falls ein Zahn komplett durch eine Verletzung aus dem Mund herausgeschlagen wurde, bringen Sie den Zahn so schnell wie möglich zu Ihrem Zahnarzt. Ihr Zahn kann möglicherweise wieder in Ihren Mund eingefügt werden.

Wie behandelt ein Zahnarzt einen...?

abgeschlagenen Zahn - Falls Sie keine Schmerzen haben und das abgeschlagene Stück klein ist, können Sie selbst entscheiden, wann und wie der Zahn repariert werden soll. Abhängig von der Grösse des abgeschlagenen Stückes, kann der Zahn geglättet oder kosmetisch korrigiert werden. Andere Möglichkeiten umfassen Veneere, Kronen oder Füllungen. Bitten Sie Ihren Zahnarzt, Ihnen diese Möglichkeiten zu beschreiben. Falls eine Füllung oder ein künstlicher Zahn abgeschlagen wird, sollte er repariert werden.

abgebrochenen oder gebrochenen Zahn - Abgebrochene oder gebrochene Zähne sollten schnellstmöglich behandelt werden, um weiteren Schaden zu vermeiden. Es kann eine Behandlung des Wurzelkanals oder eine Wurzelextraktion notwendig sein. Wenn ein Riss Auswirkungen auf den Zahnschmelz oder das Zahnbein eines Zahns hat, stellt eine Überkronung häufig die beste Behandlungsform dar. Bedenken Sie, dass Risse nicht immer sichtbar sind, nicht einmal auf Röntgenaufnahmen. Die Symptome können Schmerzen beim Kauen und Empfindlichkeit gegenüber kalten und heissen Lebensmitteln und Flüssigkeiten sowie Luft sein und können im Laufe der Zeit stärker werden.

ausgeschlagenen Zahn - Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Wiedereinsetzen des Zahns liegt darin, diesen schnellstmöglich in das Zahnfach zu reimplantieren. Mit jeder Minute, die vergeht, sterben mehr Zellen an der Zahnwurzel. Falls möglich, spülen Sie den Zahn nur mit Wasser, stecken Sie den Zahn an seinen Platz und gehen Sie schnellstmöglich zum Zahnarzt. Der Zahn sollte nur an der Krone berührt werden und darf nicht austrocknen. Am wahrscheinlichsten ist eine erfolgreiche Reimplantation innerhalb der ersten 30 Minuten. Bis zu zwei Stunden bestehen aussichtsreiche Chancen. Möglicherweise muss Ihr Zahnarzt ein bis zwei Wochen nach Stabilisierung des Zahns eine Behandlung des Wurzelkanals vornehmen.

Dauerhaft verlorene Zähne sollten, unabhängig davon, ob sie durch den Zahnarzt gezogen oder durch einen Unfall ausgeschlagen wurden, ersetzt werden. Dies sollte zur Vermeidung von Problemen wie Schwierigkeiten beim Kauen und Sprechen, eine Verschiebung der Stellung der übrigen Zähne, Störungen am Kiefergelenk aufgrund des Kauens auf der Seite mit der Mehr-

zahl von Zähnen und einer Schwächung des Kieferknochens geschehen. Die Möglichkeiten, einen verlorenen Zahn zu ersetzen, umfassen Brücken, Zahnprothesen und Implantate.

gebrochenen Kiefer - Falls Sie den Verdacht haben, der Kiefer einer Person könnte gebrochen sein, bewegen Sie diesen nicht. Der Kiefer sollte mit einem Taschentuch, einer Krawatte oder einem gerollten Handtuch um den Kiefer und über den Kopf an seinem Platz fixiert werden. Kalte Kompressen sollten zu einer Verminderung der Schwellung verwendet werden. Begeben Sie sich unmittelbar in die Notaufnahme eines Krankenhauses oder rufen Sie Ihren Zahnarzt an.



Abgebrochener Frontzahn



Herausgeschlagener bleibender Zahn



Fügen Sie den ausgeschlagenen Zahn vorsichtig wieder ein und suchen Sie sofort Ihren Zahnarzt auf.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.colgate.de